

# Egenerklærings skjema – Mpox



Etternavn, fornavn:	
Fødsels- og personnummer/ D-nummer:	
Adresse og postnummer:	
Telefonnummer:	

Kartlegging før vaksiner	JA	NEI	Ikke Aktuelt
<b>Hvis du allerede har fått dose 1 av mpoxvaksinen, har det gått 28 dager siden vaksinerings?</b> Andre dose kan gis tidligst 28 dager etter første dose.			
<b>Har du feber over 38 grader?</b> Hvis ja, da må du vente til du er frisk, uten tegn til infeksjon eller feber før du kan vaksineres.			
<b>Har du kjent allergi mot egg eller tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, mat, medisiner eller annet?</b> Hvis ja, da må du vaksineres med lege til stede og vente 1 time etter vaksinasjonen. Tommelfingerregel: Dersom du kan spise egg, kan vaksine gis.			
<b>Har du fått andre vaksiner i løpet av de siste 7 dagene?</b> Hvis ja, når? Det bør gå minimum 7 dager mellom vaksiner. Mellom mpoxvaksine og andre levende vaksiner (f.eks BCG, MMR og gulfebervaksine) bør det gå minimum 4 uker.			
<b>Har du tidligere fått påvist mpox?</b> Personer som tidligere har fått påvist mpox vil ikke ha behov for vaksine. Dersom man får påvist mpox etter første dose, er det ikke behov for å gi andre dose.			
<b>Er du gravid eller planlegger å bli gravid de neste 3 månedene?</b> Gravide skal normalt ikke ha levende vaksiner, med mindre lege har anbefalt vaksinerings.			

## Informasjon angående registrering til SYSVAK

Alle vaksiner blir registrert i SYSVAK (Nasjonalt vaksinerregister ved Folkehelseinstituttet). Det tar noen dager før vaksinen(e) blir synlig på Mine vaksiner i Helsenor.no.

Fylles ut av vaksinator dersom det ikke dokumenteres i EPJ/SYSVAK umiddelbart

Dato:	
Navn på vaksine:	
Batch/LOT nummer:	
SYSVAK kode:	
Årsak til vaksinerings:  1. Risikogruppe 2. Helsepersonell 3. Annet 4. Gravid 2.trimester 5. Gravid 3. trimester 6. Ukjent årsak	

Navn (blokkbokstaver) og signatur <b>rekvirent</b> :	Navn (blokkbokstaver) og signatur <b>vaksinatør</b> :
--	---