



Egenerklæringsskjema – Inaktiverte vaksiner

For eksempel koronavaksine, influensavaksine og pneumokokkvaksine.

Samvaksinerings:

Influenza, korona og pneumokokkvaksine kan tas samtidig.

Korona- og pneumokokkvaksine settes i hver sin arm, influensavaksinen settes i valgfri arm.

Etternavn, fornavn:	
Fødsels- og personnummer/ D-nummer:	
Adresse og postnummer:	
Telefonnummer:	

Kartlegging før vaksinerings	JA	NEI
Har du feber over 38 grader? Hvis ja, da må du vente til du er frisk, uten tegn til infeksjon eller feber før du kan vaksineres		
Har du fått andre vaksine i løpet av de siste 7 dager? Det skal normalt gå en uke mellom vaksiner.		
Har du kjent allergi mot egg eller tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, mat, medisiner eller annet? Hvis ja, da må du vaksineres med lege til stede og vente 1 time etter vaksinasjonen. Tommelfingerregel ved eggeallergi: Dersom du kan spise egg, kan vaksine gis.		
Har du blødersykdom eller bruker medisiner som gjør at du blør lett? Du kan likevel få vaksine, men innstikksstedet komprimeres litt lengre.		
Informasjon angående graviditet er gitt? Som et føre var prinsipp, vaksineres normalt sett ikke gravide i 1.trimester. Vaksinerings avventes vanligvis til 2. eller 3. trimester.		

Informasjon angående registrering til SYSVAK

Alle vaksiner blir registrert i SYSVAK (Nasjonalt vaksinereregister ved Folkehelseinstituttet). Det tar noen dager før vaksinen(e) blir synlig på Mine vaksiner i Helsenorge.no.

Fylles ut av vaksinatør dersom det ikke dokumenteres i EPJ/SYSVAK umiddelbart

Dato:	
Navn på vaksine:	
Dosestørrelse:	
Navn på vaksinatør:	
Batch/LOT nummer:	
Årsak til vaksining: 1. Risikogruppe 2. Helsepersonell 3. Annet 4. Ukjent årsak	
Navn (blokkbokstaver) og signatur rekvirent:	
Navn (blokkbokstaver) og signatur vaksinatør:	